

# KILARVOL 2 EC

## Larvicida Emulsión Concentrada 2%

**Kilarvol® 2 EC** es un regulador del crecimiento (IGR) de los insectos y/o arácnidos que permite que insectos como pulgas (*Pulex sp.*, *Ctenocephalides sp.* y otras), baratas (*Blattella sp.*), garrapatas (*Rhipicepalus sanguineus*), chinches (*Cimex lectularius*), otros insectos y/o arácnidos sean eliminados al no poder completar su ciclo de desarrollo.

**Kilarvol® 2 EC** posee un efecto insecticida sobre formas pre adultas de estos insectos-plaga, por lo que no posee efecto inmediato en el control de estados adultos.

**Kilarvol® 2 EC** tiene un mecanismo de control diferente a los insecticidas tradicionales, por lo que se complementa apropiadamente dentro de un plan de manejo integrado de plagas.

**Kilarvol® 2 EC** tiene efecto incluso sobre cepas de insectos resistentes a los insecticidas de uso común (piretroides, organofosforados y carbamatos).

**Kilarvol® 2 EC** debe ser mezclado con un insecticida adulticida para obtener un rápido control de insectos adultos, pudiendo emplearse como único método de control cuando el nivel de estos insectos-plaga sea baja.

**Kilarvol® 2 EC** posee una baja toxicidad para el Hombre, animales domésticos y aves.

Fabricado por: Intrade S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
Fax: (56) 2 2749 8541  
[www.bts.cl](http://www.bts.cl)



v.4

## Kilarvol® 2 EC

**Primeros auxilios:**  
En caso de sospecha o contacto accidental con el producto, detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto. Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.

Dosis:

Lugar a tratar	Plaga	Dosis de Kilarvol® 2 EC	Observaciones
Viviendas, casinos, restaurantes, bodegas, patios, agroindustrias, etc	Pulgas	<b>Tratamiento Inicial:</b> 125 a 200 cc / 5 L de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex® 20 EC, BTFly® 25 ME en las dosis habituales de estos productos. <b>Tratamiento Mantenimiento:</b> 125 cc / 5 L de agua.	<b>Aplicar mediante aspersión ligera con un cubrimiento de 100 m<sup>2</sup></b> cada 5 litros de emulsión. Si la superficie es absorbente, puede aumentar la dosis hasta punto de goteo.
	Baratas, Garrapatas, Chinches, etc.	<b>Tratamiento Inicial:</b> 250 cc / 5 L de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex® 20 EC, BTFly® 25 ME en las dosis habituales de estos insecticidas. <b>Tratamiento Mantenimiento:</b> 125 cc / 5 L de agua.	

Para el control de pulgas, es recomendable realizar previamente un buen aseo de la vivienda o lugar a tratar. Se sugiere el uso de aspiradora en pisos y tapices.

**Tiempo de Reingreso:**  
2 horas después de la aplicación. Luego de ésta, ventilar el recinto tratado. Si la aplicación es en el exterior, no hay tiempo de reingreso.

- Precauciones:**
- Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente la etiqueta y siga las instrucciones indicadas en la hoja de seguridad.
  - Para su aplicación, emplee equipo de seguridad personal (guantes resistentes a químicos, máscara, overol y antiparras).
  - Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
  - Evitar la inhalación de humo y vapores.
  - Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases en los lugares operativos con exposición.
  - Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
  - Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales domésticos.
  - No aplique este producto sobre alimentos, utensilios de cocina, jaulas o acuarios.
  - Para la eliminación de los envases, someter a un proceso de triple lavado y perforar. Eliminar los envases vacíos en un centro de acopio o un incinerador aprobado para químicos.
  - Almacenar este producto en su envase original cerrado.
  - Almacenar en áreas bien ventiladas, secas y sin luz directa.
  - Envases dañados: colocar los envases originales en otros más grandes, especialmente etiquetados. Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto.

**Contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua. Luego, enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.

**Contacto con los ojos:** Quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.

**Ingestión:** No induzca el vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y recurra inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

**Antídoto y aviso al médico:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**Fórmula:**  
Cada 100 g contiene:  
Pyriproxyfen ..... 2 g (CAS 95737-68-1)  
Excipientes c.s.p. .... 100 g

Grupo Químico: Mimico de hormona juvenil.

**Condición de venta: Especializada**  
**Este producto es Clase IV OMS. Poco probable peligro en su uso normal.**

Registro ISP N°: P-483/12

**Teléfonos de emergencia:**  
En caso de intoxicaciones llamar a CITUC: (56) 2 2635 3800  
En horario de oficina, llamar a:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540

Serie:  
Vence:

**Toxico para organismos acuáticos.**

**No elimine el contenido de este envase a cursos o fuentes de agua.**

v.4

**Contenido: 1 Litro**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
**CUIDADO**

