

# Kilarvol® 15 EC

## Concentrado Emulsionable 15% Pyriproxifen 15%

KILARVOL 15 EC es un regulador del crecimiento de insectos (IGR) que evita el completo desarrollo de sus formas pre-adultas (larvas y ninfas), impidiendo de esta forma que completen su ciclo vital y lleguen al estado adulto.

KILARVOL 15 EC puede ser usado en interiores y exteriores de empresas de alimentos, casas y oficinas, bodegas, establos, etc.

KILARVOL 15 EC tiene un efecto sobre distintos tipos de moscas, coleópteros, zancudos, mosquitos, garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas, cucarachas, arañas y chinches entre otros.

KILARVOL 15 EC debe ser aplicado en el sustrato en donde se desarrollan los insectos-plaga que se desea controlar. Ej: basurales, vertederos, suelos, pozos negros, acumulo de excretas o purines, grietas y rendijas, aguas estancadas, purineras, etc.

KILARVOL 15 EC es un elemento importante dentro del plan de manejo integrado de plagas (MIP), funciona incluso contra cepas de insectos resistentes a los insecticidas tradicionales como piretroides, organofosforados y otros destinados al control de insectos ya adultos.

KILARVOL 15 EC no mata insectos adultos, por lo que es necesario complementar su uso con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC o Alftox EC.

Fabricado por: Intrade S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl



VENENO



## Kilarvol 15 EC 1 L

### Precauciones:

- NO APLICAR EN RECINTOS DONDE HAYA PERSONAS PRESENTES.
- NO APLICAR DIRECTAMENTE A SUPERFICIES QUE ESTARÁN EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

- ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA ETIQUETA.

- Para su aplicación emplee equipo de seguridad personal (guantes y máscara).
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber, fumar durante la manipulación.
- Almacenar el producto en su envase original cerrado. Almacenar en áreas bien ventiladas, secas y sin luz directa. Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales domésticos.
- No aplique este producto sobre alimentos o utensilios de cocina.

### Periodo de reingreso al área tratada:

2 horas. Ventile por 15 minutos y luego ingrese.

### Primeros auxilios:

En caso de sospecha o contacto accidental con el producto detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto. Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.

**Contacto con la piel:** Quite ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua, luego enjuague con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.

**Contacto con los ojos:** Quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.

**Ingestión:** No induzca al vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y procure llamar inmediatamente a un médico. Muestre la etiqueta u hoja de seguridad.

**Antídoto y aviso al médico:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**Almacenamiento:** MANTENGA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, EN SU ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS, NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

**Eliminación:** REALICE TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES Y PERFÓRELOS ANTES DE LA DISPOSICIÓN FINAL.

### Indicación de Uso:

Aplicar sobre el sustrato en donde se reproduce la especie plaga a controlar.

### Dosificación General:

**Moscas y otros voladores:** Se recomienda usar 1 cc de KILARVOL 15 EC por m<sup>2</sup> de superficie. Como recomendación práctica diluir 60 cc de KILARVOL 15 EC en 15 litros de agua en una bomba de espelda y aplicar la mezcla en 60 m<sup>2</sup> de sustrato. Repetir a los 20 ó 30 días.

**Insectos rasteiros (baratas, tijeretas, garrapatas, chinches, etc.):** Disuelva 100 cc en 5 litros de agua, asperje en 100 m<sup>2</sup>. Asperje en lugares de tránsito o reproducción de los insectos.

### Teléfonos de emergencia:

En caso de intoxicaciones llamar a CITUC: (56) 2 2635 3800  
En horario de oficina, llamar a:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540

### Registro ISP N°: P-619/17

**Producto de venta especializada**  
**Categoría IV OMS-EPA: Producto que normalmente no ofrece peligro.**

### Fórmula:

Cada 100 g contiene:  
Pyriproxifen (CAS N°: 95737-68-1) ..... 15 g  
Otros componentes c.s.p. .... 100 g

### Grupo químico: Mímico de hormona juvenil

**Acción tóxica:** Supresor de embriogénesis y formación del adulto

Serie:  
Venca: