

Fabricado por:
Dankong Industry &
Trade Group Co. Ltd.
83 Jiefang North road,
Jiaojiang 318000,
Zhejiang, China.

INDICACIONES

Dosis general: 1 g de **STOPFLY** por metro cuadrado de superficie de materia orgánica a tratar.

METODO DE APLICACION:

Disolver una medida (20 g) de **STOPFLY** en 5 litros de agua. Aplicar en dosis de 250 cc de solución por metro cuadrado de superficie; 5 litros de solución se deben aplicar sobre 20 metros cuadrados. Es muy importante respetar la dosificación y cubrimiento.

La aplicación debe ser realizada con un tamaño de gota gruesa (300 a 400 micras) mediante una máquina pulverizadora de espalda o bien una regadera.

El tratamiento debe ser complementado con insecticidas adulticidas tradicionales para el control de moscas adultas.

El tratamiento con **STOPFLY** debe ser repetido según las condiciones cada 20 a 45 días.



STOPFLY es un insecticida regulador del crecimiento de larvas de moscas. Actúan impidiendo que éstas puedan completar su ciclo y emerger de la pupa.

STOPFLY es altamente recomendable para la implementación de un programa integral del control de moscas.

STOPFLY funciona incluso ante larvas de moscas resistentes a otros insecticidas tradicionales.

STOPFLY no tiene efectos sobre las moscas adultas, por lo que se debe emplear solo en el tratamiento de las moscas preadultas (larvas).

STOPFLY actúa sobre larvas de otros dípteros de importancia en Salud Pública como los zancudos.

STOPFLY a diferencia de los insecticidas tradicionales, tiene como ingrediente activo un compuesto que afecta sólo a los insectos, por lo que posee una baja toxicidad para el hombre y animales domésticos.

STOPFLY está indicado para ser usado en salas de basura, basurales, fecas de animales domésticos, mataderos y otros lugares en donde se acumula materia orgánica susceptible de ser fuente de generación de moscas.

Contenido:

500 g



PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al afectado en reposo.
- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente. No aplicar ningún medicamento, excepto el indicado por el médico.
- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo la piel que se encuentra bajo las uñas. Sacar la ropa contaminada y lavar la piel.
- **Inhalación:** Sacar a la persona desde el área contaminada al aire fresco. Si es necesario, aplique respiración artificial.

OBSERVACIONES

STOPFLY es un IGR (regulador del crecimiento de insectos) derivado del grupo de las triazinas.

STOPFLY posee una muy baja toxicidad, sin embargo, se deben observar las siguientes medidas de precaución:

- Evitar inhalar durante la aplicación y la dilución del producto.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
- Usar siempre ropa y equipo de protección adecuado: overall, máscara de protección respiratoria, anteojos, botas y guantes de goma.
- No aplicar en recintos en donde se acumulan alimentos.
- Almacenar el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos de consumo humano o animal.
- Antes de aplicar, lea cuidadosamente toda la etiqueta y destruya el envase una vez vacío.

ANTIDOTO

No hay antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático.

COMPOSICION

Cada 100 g de producto contiene:
Círomazina sulfato..... 50 g
Excipientes c.s.p.100 g

En caso de intoxicaciones
llame al: CITUC: (2) 2635 3800
BTS-Intrade Laboratorios S.A.:
(56 2) 2749 8540

Registro ISP N° P-360/13

Condición de Venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica: Clase IV,
Poco probable peligro en su uso normal.

S.V.E.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CUIDADO

