



VENENO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

FÓRMULA

Bromadiolona	0.005 g
N° CAS 28772-56-7	
Benzoato de Denatonio	0.001 g
Excipientes	c.s.p. 100 g

Registro ISP N° P-269/16
Autorización SAG N°: 1686 Cebo (RB)

Condición de venta:
General.

Clasificación Toxicológica IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO CUIDADO

DEADLINE Cebo Molienda es un potente raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores, incluso aquellos resistentes a otro tipo de raticidas.

DEADLINE Cebo Molienda necesita sólo una dosis para producir la muerte por hemorragias internas a los 4-7 días de su ingestión.

Modo de uso:

Viene listo para usar. Distribuya los cebos en lugares frecuentados por los roedores y que no sean accesibles a los niños y animales domésticos. Reponga cada 1 semana hasta que cese el consumo de **DEADLINE Cebo Molienda**.

Contenido Aproximado: 500 g (20 sachets de aproximadamente 25 g c/u).

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540

Fabricado y envasado por:
Intrade S.A.
Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios
Mar del Sur 7358,
Pudahuel, Santiago.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Precauciones:

Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y en un lugar seguro. No almacenar junto con alimentos. No fume, beba o coma durante la aplicación. Evite el contacto con la piel o los alimentos. Una vez realizada la aplicación, lávese las manos con abundante agua y jabón. Elimine en forma segura el envase una vez vacío.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se pueda observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones. Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión accidental, acudir al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K1

Instrucciones de Uso:

Especie plaga	Dosis
Ratón doméstico	1 sachet cada 3 - 5 m
Rata de tejado	1 - 2 sachet cada 5 - 10 m
Rata de alcantarilla	1 - 2 sachet cada 5 - 10 m

En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del nivel de infestación presente.

Instalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores.

Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

DEADLINE®

CEBO RATICIDA
Listo para usar

Cebo Molienda



Mata ratas y ratones CON UNA SOLA DOSIS

Contenido aprox:
500 g

