

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión involuntaria no provoque vómitos y conduzca al afectado a un centro de asistencia llevando el envase del producto. Efectuar lavado gástrico, siempre que la cantidad ingerida, el tiempo transcurrido desde el accidente y las condiciones clínicas del accidentado lo hagan posible. La administración posterior de una suspensión de carbón activado y un purgante salino puede favorecer la eliminación del producto y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

ANTIDOTO

El ingrediente anticoagulante se trata con vitamina K. El ingrediente insecticida no posee antidoto y sólo se trata sintomáticamente.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Condición de venta: GENERAL

Clasificación Toxicológica IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal, Banda Verde.

FÓRMULA

Cada 100 g de producto contiene:

Bromadiolona.....0,005 g (N° CAS 28772-56-7)
IUPAC: 3-[3-(4-bromobifenil-4-ii)-3-hidroxi-1-Fenilpropil]-4-hidroxicumarina
Fipronil.....0,005 g (N° CAS 120068-37-3)
IUPAC: 5-amino-1-(2,6-dicloro-a,a,a-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilprazol-3-carbonitrilo
Benzoato de denatonium.....0,001 g
IUPAC: benzoato de fenilmetil-[2- [(2,6-dimetilfenil)amino]- 2-oxoetil]-diethylamonio
Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo Químico:

Bromadiolona: Derivado cumarínico.
Fipronil: Fenilpirazol.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Viene listo para usar, cada bloque cuenta con un agujero central que facilita su instalación. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero asee el lugar y determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, botaderos, entradas de madrigueras, orillas de cursos de agua, etc.). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad.

Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de Ratamix Bloque Parafinado. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC) o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 bloques / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 bloque / 3 a 5 metros lineales

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos. Evite el contacto con la piel. Use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de ésta. Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos, lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de los mismos. Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos en forma segura. Este producto es extremadamente tóxico para mamíferos y vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados. No fume o coma durante la aplicación. Este producto es tóxico para organismos acuáticos.

TIEMPO DE REINGRESO

Sin carencia, inmediatamente después de la aplicación.

SINTOMAS DE INTOXICACION

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.



Ratamix Bloque Parafinado es un raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores.

Ratamix Bloque Parafinado está formulado con ingredientes frescos y aromatizantes altamente atractivos para roedores.

Ratamix Bloque Parafinado posee además un efectivo insecticida contra las pulgas presentes en los roedores. Con **Ratamix Bloque Parafinado** se logra realizar un efectivo control de roedores junto con la eliminación de las pulgas que de otra manera, persistirán en el ambiente, buscando otro huésped como animales domésticos y el hombre.

El efecto de **Ratamix Bloque Parafinado** sobre las pulgas que parasitan a los roedores, se verifica a contar del tercer día de la ingesta de este producto por parte de los roedores. Las pulgas son hematófagas (se alimentan de sangre del roedor). **Ratamix Bloque Parafinado** posee en su fórmula un insecticida que al estar presente en una mínima dosis en la sangre del roedor, ocasionará la muerte de las pulgas al momento de alimentarse. La dosis de insecticida presente en **Ratamix** es muy baja, por lo que no altera el consumo de cebos por parte de los roedores y no implica riesgo para las personas.

Ratamix Bloque Parafinado necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores y sus pulgas en un periodo de entre 4 - 7 días.

Ratamix Bloque Parafinado contiene un amargante que previene la ingesta accidental por parte del ser humano.

Ratamix Bloque Parafinado es resistente al agua y humedad, pudiéndose usar en interiores y exteriores húmedos conservando inalterable su acción y palatabilidad.

Ratamix Bloque Parafinado está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención, en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Bloque Parafinado

BROMADIOLONA 0,005% - FIPRONIL 0,005% RODENTICIDA

CONTIENE
AMARGANTE
PREVENTIVO DE INGESTA HUMANA

Rata Mix®

Una Aplicación...
Dos Soluciones



CONTROL DE ROEDORES Y SUS PULGAS



Contenido aprox:

500 g

BTS INTRADE
LABORATORIOS