

DESCRIPCIÓN:

Aditivo probiótico para contribuir al equilibrio de la flora intestinal. Uso exclusivo para alimentación animal.

COMPOSICIÓN:

Se adjunta tabla con la composición del producto

Contenido	Porcentaje contenido microbiano
Contenido microbiano	
<i>Lactobacillus plantarum</i>	6.30
<i>Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaris</i>	10.30
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10.30
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	10.30
<i>Bifidobacterium bifidum</i>	10.00
<i>Streptococcus salivarius subsp thermophilus</i>	20.50
<i>Enterococcus faecium</i>	32.30
Contenido microbiano total	100.00%
Excipientes	
	Porcentaje de peso total
Dextrosa monohidrato	96.67

INDICACIONES DE USO:

Este producto está indicado para ser usado en aves, ganado bovino, ovejas, cabras y cerdos. El producto puede ser administrado en el alimento así como en el agua de bebida.

Especie	Indicación uso en alimento (gramos por tonelada)	Indicación uso en agua (gramos por litro)
Aves		
Cría (1-21 días)	150	1g/litro 5-7 días
Crecimiento (22-35 días)	100	1g/ 2 litros
Término (36-49 días)	50	1g/ 4 litros
Reproductores	50	1g/ 4 litros
Ponedoras	50	1g/ 4 litros
Ganado bovino		
Vaquillas	75	0.25g/animal/día
Vacas lecheras/ Ganado carne	50	0.25g/animal/día
Ovejas/cabras		
Corderos/cabritos	50	0.25g/animal/día
Ovejas/Cabras adultas	50	0.25g/animal/día
Cerdos		
Cerdas	20	0.2g/animal/día
Lechones (31-60 días)	200	0.2g/animal/día
Crecimiento (61-135 días)	100	0.2g/animal/día
Término	50	0.2g/animal/día

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA MEJORAR EL USO Y CONSERVACIÓN CUNADO CORRESPONDA:

No existen restricciones para el uso de este aditivo. Sin embargo, sí se le adiciona leche o agua debería ser consumido dentro de 12 horas.

Fabricado:
Probiotics International Limited
Lopen Head, South Petherton
Somerset, TA13 5JH
Reino Unido.

Importado y Distribuido por:
Novartis Chile S.A.
Ruta 5 Sur Km 1012
Fono: (65)2231400 Fax:(65)2231411
Puerto Varas, Chile.

Monografía aprobada mediante
Resolución Exenta SAG N° 4019
10-07-2012.