

# ALFITOX EC

Emulsión Concentrada

Deltametrina 1% y Pirimifos Metil 25%

Alfitox EC es un insecticida de amplio espectro de acción, largo efecto residual y gran efecto expulsivo contra insectos rastreros y voladores.

Posee además una marcada acción sobre coleópteros y lepidópteros.

Alfitox EC es eficaz en el manejo de la resistencia causada por los insecticidas tradicionales, debido a que posee dos ingredientes activos que tienen diferentes mecanismos de acción sobre el insecto plaga.

Alfitox EC permite un rápido control de los insectos debido a la presencia de Pirimifos Metil en su fórmula, este efecto es mantenido en el tiempo por la Deltametrina, permitiendo un efecto repilento en este producto.

Alfitox EC está especialmente formulado para ser empleado en el control de plagas de explotaciones pecuarias, bodegas, silos y todo tipo de instalaciones. No se recomienda el uso intradomiciliario.

El tiempo de reingreso de personas al interior de recintos tratados es de 1-2 horas después de ventilar.

Alfitox EC es eficaz en el control de gorgojos y polillas de granos almacenados, moscas, baratas, coleópteros (*Alphitobius diaperinus*), pulgas, zancudos, tijeretas, arañas y otros insectos presentes en el entorno peridomiciliario, explotaciones pecuarias y otros.

#### Precauciones para personas y medio ambiente

- Emplee este producto con equipo de protección personal completo: buzo u overall, gafas, máscara de protección respiratoria apropiada, gorro, guantes y botas.
- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, fumar o beber mientras se está aplicando este producto.
- Al finalizar la aplicación, lávese las manos con agua y jabón.
- Guarde este producto en un recinto apropiado bajo llave.
- Tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido de este envase en cursos de agua.
- Realice triple lavado de los envases antes de su eliminación.
- **Precauciones de almacenamiento y conservación**
- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
- Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
CUIDADO

Fabricado por: Intrade S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:  
BIOPHARM S.A.  
Centro Logístico Dos Caminos, Galería 5  
Carretera Panamericana, Bién de Tocumen  
(Las Matanzas)  
Teléfonos: 3947536 – 66754548  
www.biopharm.com.pa  
Ciudad de Panamá – República de Panamá.



V1

#### Forma de aplicación:

- La forma de aplicación dependerá de la especie plaga que se desee controlar. Para insectos voladores como moscas, debe aplicarse en todos los lugares en donde éstas se posen, con especial énfasis en las paredes de orientación norte, cerchas, vigas, pilares, etc. Es recomendable la aplicación durante las horas de menor temperatura. La aspersión con gota gruesa (200 a 300 micras) es la más indicada para este efecto. Repetir el tratamiento a necesidad.
- Los insectos rastreros como cucarachas, arañas y alacranes son controlados mediante la aplicación por aspersión de los cimientos de las construcciones. Especial énfasis debe ponerse en los sectores húmedos y sombríos.
- Las pulgas presentes en patios y bodegas deben ser controladas asperjando toda la superficie del suelo, idealmente luego de haber hecho un aseo previamente. No aplique este producto sobre perros ni otro animal doméstico.

Alfitox EC puede ser aplicado por aspersión manual y mecánica, termoneblía y equipos de ultra bajo volumen. Considere que el efecto residual de la aplicación por termonebulización y UVB es menor al obtenido por aspersión.

#### Dosificación:

Forma de Aplicación	Plagas	Dosificación
Aspersión	Insectos voladores	80 a 100 cc / 100 m <sup>2</sup>
	Insectos rastreros	100 a 120 cc / 100 m <sup>2</sup>

Calibre siempre su equipo de aspersión previo a la aplicación. En general, una bomba de aspersión de espalda cubre 100 m<sup>2</sup> con 5 litros de agua. Para equipos de aspersión mecanizados y turbos, debe calibrar previamente el gasto de agua.

En superficies porosas se requiere más agua para asperjar una misma cantidad de superficie comparada con una superficie no absorbente.

Forma de Aplicación	Plagas	Dosificación
Termoneblía	Insectos voladores	50 cc / 1.000 m <sup>2</sup>
	Insectos rastreros	60 cc / 1.000 m <sup>2</sup>
ULV	Interiores	50 cc / L / 1.000 m <sup>2</sup>
	Exteriores	50 cc / L / há

Revise cuidadosamente el manual de uso de su equipo termonebulizador o UBV. Respete las indicaciones del fabricante en lo referente al cubrimiento y tiempo empleado. Emplee sólo el solvente recomendado para su equipo.

#### Teléfono de Emergencia Panamá:

Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET):  
(507) 523 6312

Serie:

Vence:

Fabricación:

Alfitox EC 1 L

#### Síntomas de Intoxicación:

Podría generar adormecimiento de labios y lengua, estornudos, vómitos, diarreas, urticaria (en caso de contacto con la piel) y convulsiones en casos muy excepcionales.

#### Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión, no induzca el vómito y transporte al paciente a un centro asistencial.
- Muestre la etiqueta u hoja de seguridad al médico tratante.
- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto. Lave los ojos con agua por 10 minutos, si la irritación persiste consulte a un médico.
- En caso de inhalación, retire al afectado a un lugar ventilado.

#### Antídoto:

Atrapina, más el soporte paliativo que el paciente requiera.

#### Composición:

Deltametrina..... 1 g      N° CAS 52918-63-5  
Pirimifos Metil..... 25 g      N° CAS 29232-93-7  
Excipientes c.s.p...100g

Clase Toxicológica III OMS, Ligeramente Peligroso

#### Grupo Químico:

Deltametrina : piretroide  
Pirimifos Metil: organofosforado

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES  
DOMÉSTICOS.

Registro Panamá MIDA N°: RQ-434-10

Registro ISP Chile N°: P-441/11

Contenido: 1 Litro

