

Instrucciones de uso y dosis:

El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año.

Primero asee el lugar y determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, desajgues, entretechos, alcantarillas, botaderos y orillas de cursos de agua). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad.

Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente.

Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de **Rodex Soft Bait**. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC) o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guracán) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejadó)	1 a 2 bloques / 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 bloque / 3 a 5 metros lineales.

Tiempo de Reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

- En caso de ingestión accidental, acudir al centro asistencial más cercano llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K1 (fitomenadiona).

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO CUIDADO



VENENO

Fabricado por:
Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2,
1360, Vrhnika. Eslovenia.

Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358. Pudahuel.
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



CEBO RATICIDA
Listo para Usar
Bloque Blando Parafinado
Brodifacoum 0,005%

Rodex
Soft Bait



MÍNIMA dosis
para un
MÁXIMO control.

Contenido aprox:

10 Kg

Bloques Blandos de 10 g aprox.



Rodex Soft Bait es un eficaz raticida anticoagulante de última generación, para el control de ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 – 7 días de su ingestión.

Rodex Soft Bait es un cebo blando elaborado con una atractiva mezcla de cereales, granos frescos y aceites esenciales, moldeados como pasta para aumentar la palatabilidad, lo que asegura el consumo por parte de los roedores sin importar su especie.

Rodex Soft Bait posee una formulación que resiste condiciones ambientales desfavorables, sin perder su atractivo ni eficacia.

Rodex Soft Bait está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención. Puede ser empleado en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, hoteles, restaurantes, mataderos, oficinas, empresas pecuarias, industria de alimentos y todo tipo de construcciones e incluso permite cebar directamente las madrigueras de los roedores.

Precauciones para Personas y Medio Ambiente

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de ésta.
- No beber, fumar o consumir alimentos durante la aplicación.
- Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos, lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de los mismos.
- No almacene junto con alimentos.
- Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua.
- Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos.
- Este producto es extremadamente tóxico para mamíferos y vida silvestre.
- Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

Precauciones de Almacenamiento y Conservación

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal, Banda Verde.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:

Brodifacoum.....0,005 g (N° CAS 58073-10-0)

IUPAC: 3-[3-(4'-bromodifenil-4-ii)-1,2,3,4-tetrahidro-1-natij]-4-hidroxicumarina

Benzoato de denatonio (amargante).....0,001 g

Otros componentes c.s.p..... 100 g

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Registro ISP N°: P-756/16

S:
V:
E: