

F i c h a T é c n i c a

BT-1000

de las moscas, el fin.



Soluciones en Higiene Ambiental

www.bts.cl



Descripción del Producto

BT-1000® Granulado, es un potente y efectivo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas.

BT-1000® Granulado está formulado en base a Metomilo, un eficaz ingrediente activo de la familia de los carbamatos que actúa a nivel de la acetil colinesterasa. Por ésta característica, es una herramienta de uso obligatorio en cualquier programa de control de moscas, ya que complementa la acción de insecticidas piretroides y neonicotínicos. Esto reduce en forma significativa el riesgo de resistencia, permitiendo controles óptimos incluso en el peak de la temporada.

BT-1000® Granulado posee Z-9 Tricosene (o muscalure), una potente feromona que permite la atracción de moscas. Además, la formulación viene enriquecida con lactosa y azúcares que fomentan la atracción de moscas domésticas, así como también de otras especies de moscas como es el caso de *Fannia canicularis*. La alta capacidad de atracción de su formulación, así como la potencia de su ingrediente activo, permiten dirigir la caída de las moscas, reduciendo la contaminación con cadáveres de moscas muertas en lugares indeseados y permitiendo la evaluación del tratamiento.

BT-1000® Granulado permite el Control Integrado de Moscas en explotaciones pecuarias, bodegas, establos, industrias, basurales y en general en todos aquellos lugares donde las moscas representen un problema de salud ambiental.

BT-1000® Granulado se caracteriza por tener un muy rápido efecto de derribo, incluso en poblaciones de moscas con índices altos de resistencia a los insecticidas tradicionales. Provoca la caída de las moscas expuestas luego de 2 a 3 minutos de exposición con el producto. **BT-1000® Granulado** actúa por contacto e ingestión, siendo esta última la más importante.

BT-1000® Granulado está recomendado para tratamientos preventivos, mantención y de choque en ambientes interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de moscas.

Instrucciones de Uso:

Forma de Aplicación	Dosis
En superficies horizontales	Aplicar 250 g de producto por cada 100 m ² de superficie de suelo a proteger. BT-1000® Granulado se aplica directamente sobre una superficie horizontal o piso de 30 x 50 cm, evitando que los granos de cebo queden uno sobre otros. Es mejor aplicar entre 10 y 20 puntos de cebo por kilo de producto que unos pocos puntos de cebo con gran cantidad de producto. NO PERMITA QUE LOS PUNTOS DE CEBO ESTÉN AL ALCANCE DE NIÑOS O ANIMALES DOMÉSTICOS.
En Portacebos	Coloque entre 50 y 100 g de BT-1000® Granulado por portacebo. Los portacebos deben colocarse a una altura de 1,8 a 2 metros de altura para una máxima efectividad. Instale entre 10 y 20 portacebos por cada 400 m ² de superficie a proteger.

*Para un mejor efecto, **BT-1000® Granulado** puede humedecerse para aumentar su capacidad de atracción y de control.*

Precauciones

Durante la manipulación y aplicación, utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada a los 15 minutos.

Síntomas de intoxicación: Salivación excesiva, diarrea, vómitos, respiración rápida y difícil.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VOMITOS**. Conduzca a la persona afectada inmediatamente a un recinto médico, llevando la etiqueta u Hoja de Seguridad del producto.

Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

Piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si presenta irritación acuda a un médico.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra inhalación y se presenten síntomas de intoxicación traslade al paciente al aire libre y conduzca al afectado a un centro hospitalario.

Antídoto: Atropina. Este producto pertenece a los carbamatos, productos que son inhibidores de la acetilcolinoesterasa.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 g de producto contienen:

Metomilo	1 g
Z-9 tricosene	0,05 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

Registro ISP N° : P-434/16

Producto Clase III OMS, Ligeramente Peligroso, banda azul.

Fabricado por Kukbo Pharma Co. Ltda. Seul, Corea.

Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel. Santiago. Fono (56) 2 27498540.

Mayores Consultas en: www.bts.cl