Kilarvol 15 EC

Concentrado Emulsionable 15%
Pyriproxifen 15%

KILARVOL 15 EC es un regulador del crecimiento de insectos (IGR) que evita el completo desarrollo de sus formas pre-adultas (larvas y ninfas), impidiendo de esta forma que completen su ciclo vital y lleguen al estado adulto.

KILARVOL 15 EC puede ser usado en interiores y exteriores de empresas de alimentos, casas y oficinas, bodegas, establos, etc.

KILARVOL 15 EC tiene un efecto sobre moscas, coleópteros, zancudos, mosquitos, garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas, cucarachas, arañas y chinches entre otros.

KILARVOL 15 EC debe ser aplicado en el sustrato en donde se desarrolla la insecto-plaga que se desea controlar, Ej: basurales, vertederos, suelos, pozos negros, acumulo de excretas o purines, grietas y rendijas, aguas estancadas, purineras, etc.

KILARVOL 15 EC es un elemento importante dentro del plan de manejo integrado de plagas (MIP), funciona incluso contra cepas de insectos resistentes a los insecticidas tradicionales como piretroides, organofosforados y otros destinados al control de insectos ya adultos.

KILARVOL 15 EC no mata insectos adultos, por lo que es necesario complementar su uso con un insecticida adulticida.

KILARVOL 15 EC está indicado para el control de formas larvales en ganado bovino.

Contenido: 1 Litro

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BIOPHARM S.A.
Centro Logístico Dos Caminos, Galera 5
Carretera Panamericana, Belén de Tocumen
(Las Mañanitas)
Teléfonos: 3947536 – 66754548
www.biopharm.com.pa
Ciudad de Panamá – República de Panamá.

BTS INTRADE LABORATORIOS

v.1

MUESTRA

Precauciones:

- NO APLICAR EN RECINTOS DONDE HAYA PERSONAS PRESENTES. DEBE REMOVER TODOS LOS ALIMENTOS O CUBRIRLOS DURANTE LA APLICACIÓN.
- NO APLIQUE DIRECTAMENTE A SUPERFICIES QUE ESTARÁN EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

- Antes de utilizar este producto lea cuidadosamente y siga las instrucciones indicadas en la etiqueta y en la hoja de seguridad.
- Para su aplicación emplee equipo de seguridad personal (guantes, máscara y overol).
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber, fumar durante la manipulación.
- Almacenar el producto en su envase original cerrado. Almacenar en áreas bien ventiladas, secas y sin luz directa. Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales domésticos.
- No aplique este producto sobre alimentos o utensilios de cocina.

- **Periodo de reingreso al área tratada:** 2 horas. Ventile por 15 minutos y luego ingrese.

- **Primeros auxilios:** En caso de sospecha o contacto accidental con el producto detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto.
  Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.

- **Contacto con la piel:** Quite ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua, luego enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.

- **Contacto con los ojos:** Quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.

- **Ingestión:** No induzca al vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y procure llamar inmediatamente a un médico.

- **Antídoto y aviso al médico:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

- **Almacenamiento:** MANTENGA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, EN SU ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS, NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

- **Eliminación:** REALICE TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES ANTES DE LA DISPOSICIÓN FINAL.



VENENO

Kilarvol 15 EC 1 L

Indicación de Uso:
Aplicar sobre el sustrato en donde se reproduce la especie plaga a controlar.

Dosificación General:

Moscas y otros voladores: Se recomienda usar 1 cc de KILARVOL 15 EC por m^2 de superficie. Como recomendación práctica diluir 60 cc de KILARVOL 15 EC en 15 litros de agua en una bomba de espalda y aplicar la mezcla en 60 m^2 de sustrato por aspersión. Repetir a los 20 ó 30 días.

Insectos rastreros (baratas, tijeretas, garrapatas, chinches, etc.): Disuelva 100 cc en 5 litros de agua, asperje en 100 m^2 . Asperje en lugares de tránsito o reproducción de los insectos.

Teléfonos de emergencia Panamá:
Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET): (507) 523 6312

Registro CHILE ISP Nº: P-619/12
Registro PANAMÁ MIDA Nº: RQ-665-15

Categoría IV OMS-EPA: Producto que normalmente no ofrece peligro.

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Pyriproxifen (CAS Nº: 95737-68-1) .....15 g
Otros componentes c.s.p. .....100 g

Grupo químico: Mímico de hormona juvenil
Acción tóxica: Supresor de embriogénesis y formación del adulto

Serie:

Fabricación:

Vence:

v.1