


INSECTICIDA SIN OLOR

Alfacipermetrina 3%

AquaPest[®] SC

Chile



Insecticida piretroide en formulación de Suspensión Concentrada, eficaz para el control de insectos voladores, rastreadores y arácnidos.

- ✓ Recomendado para lugares sensibles.
- ✓ Sin olor.
- ✓ Alta residualidad.
- ✓ Condición de venta general.

Contenido:
1 Litro

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

BTS
Intrade[®]
LABORATORIOS

v.9



Clasificación toxicológica III
Ligeramente Peligroso



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Tipo de aplicación	Insectos a controlar	Lugar de aplicación	Dosis recomendada
Aspersión	Voladores: moscas, polillas, avispas, zancudos, tábanos, etc.	Interior	50 ml / 5 L / 100 m ²
	Rastreadores: cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, arañas, etc.	Interior	75 ml / 5 L / 100 m ²
	Lepidópteros y coleópteros: en granos almacenados (bodegas y silos).	Interior	100 ml / 5 L / 100 m ²
Termoniebla	Voladores, rastreadores y arácnidos	Espacial (no residual)	75 - 100 ml / 1 L / 100 m ²
ULV	Voladores, rastreadores y arácnidos	Focalizada (residual) Espacial (no residual)	50 ml / 1 L solvente / 1000 m ² 50 ml / 1 L solvente / ha
			50 - 100 ml / 1 L agua / 1000 m ² 50 ml / 1 L agua / 1000 m ²

*Para aplicaciones espaciales con ULV se recomienda el uso de glicol o Carrier.

Aquapest SC es un insecticida piretroide sin olor y de larga acción residual para el control de moscas, zancudos, baratas, garrapatas, hormigas, pulgas, arañas, chinches, polillas y otros insectos plaga. Es apto para ser aplicado en cualquier superficie, en casas, empresas de alimentos, agroindustrias, empresas pecuarias, oficinas, hospitales, etc., tanto en interiores como en exteriores.

Técnicas de aplicación

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual termoniebla o ULV, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas e insectos rastreadores deben asperjarse los lugares de tránsito o descanso de los insectos. Emplee un 50% más de la dosis indicada en superficies porosas o absorbentes de exteriores. Las dosis pueden variar de acuerdo con el equipo empleado. Consulte el manual del fabricante.

Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos al recinto tratado, luego reingrese.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje sobre animales domésticos. Para su seguridad debe usar pantalones largos, camisa y guantes para la preparación y aplicación del mismo. Es aconsejable el



S:
V:
E:

AQUAPEST SC 1 L

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Sólo tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año), BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (En horario de oficina).

Condición de Venta: General

Registro ISP N°: P-992/23

Composición:

Cada 100 g de producto contiene:
Alfacipermetrina 3 g
N° CAS: 67375-30-8
Otros componentes c.s.p. 100 g

Grupo químico: Piretroide.

Fabricado por:
Tagros Chemicals India Ltd.
Jhaveri Centre, Raja Annamalai Building,
IV Floor, 72 Marshalls Road,
Egmore, Chennai, India.

Envasado, importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

