


## INSECTICIDA - LARVICIDA SIN OLOR

Deltametrina 1%  
Pyriproxyfen 4%



# Delta MAX EC®



Contenido:  
**1 Litro**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.



**BTS**  
**Intrade**  
LABORATORIOS

v.7



Clasificación toxicológica III  
Ligeramente Peligroso

### INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Tipo de aplicación	Insectos a controlar	Lugar de aplicación	Dosis recomendada
Aspersión	Insectos rastreiros y arácnidos Baja infestación	Interior y exterior	125 ml / 5 L / 100 m <sup>2</sup>
	Insectos rastreiros y arácnidos Alta infestación	Interior y exterior	250 ml / 1 L / 100 m <sup>2</sup>
Termoniebla	Insectos rastreiros y arácnidos	Espacial (no residual)	125 ml / 1 L de solvente / 1000 m <sup>3</sup> 125 ml / 1 L de solvente / ha
ULV	Insectos rastreiros y arácnidos	Espacial (no residual) Focalizada (residual)	125 / 250 ml / 1 Laguna / 100 m <sup>2</sup>

\*Para aplicaciones espaciales con ULV se recomienda el uso de glicol o Carrier.

### DELTA MAX EC 1 L

**Delta Max EC** es un eficaz insecticida en formulación de Concentrado Emulsionable, que combina un ingrediente activo adulticida con un larvicio, Deltametrina y Pyriproxyfen, permitiendo realizar el control de adultos y larvas de insectos rastreiros y arácnidos, en una misma aplicación. Elimina garrapatas, baratas, hormigas, pulgas, arañas, chinches de arce y camé, entre otros insectos plaga.

Debido a las características de la formulación de **Delta Max EC**, y a la combinación de los mecanismos de acción de ambos ingredientes activos, (adulticida y larvicio juvenil), es un producto ideal para un plan de manejo integrado de plagas (MIP).

Se recomienda para tratamientos preventivos y curativos de plagas presentes en residencias, restaurantes, hoteles, cines, teatros, hospitales, industrias de alimentos, comercio, frigoríficos, aeropuertos, instalaciones agropecuarias, etc.

#### Técnicas de aplicación

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica o bomba de espalda manual, termoniebla o ULV. Asperja hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurre). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de insectos rastreiros deben esperarse los lugares de tránsito o descanso de los insectos. Emplee un 50% más de la dosis indicada en superficies porosas o absorbentes de exteriores. Las dosis pueden variar de acuerdo con el equipo empleado. Consulte el manual del fabricante.



S:

V:

#### Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

#### Primeros auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto,

enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

**Ingesta:** No induzca el vomito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

**Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto,

**Antídoto:** No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (En horario de oficina).

**Condición de Venta:** Especializada

**Registro ISP N°:** P-741/25

**Composición:**  
Cada 100 g de producto contiene:  
Deltametrina ..... 1 g  
Nº CAS: 52918-63-5  
Pyriproxyfen ..... 4 g  
Nº CAS: 95737-68-1  
Otros componentes c.s.p. ..... 100 g

**Grupo químico:** Piretoide / Piridinas

Fabricado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl

