

INSECTICIDA TODO INSECTO

Cipermetrina 20 %



DOCTOR
FLy®
EC



Insecticida - Termiticida piretroide en formulación de Concentrado Emulsionable, eficaz en el control de insectos voladores, rastreadores y arácnidos.

- ✓ Rápido efecto y buena acción residual.
- ✓ Eficacia y ahorro en cada aplicación.



Contenido:
1 Litro

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

BTS
Intrade
LABORATORIOS



Clasificación Toxicológica IV
Poco Probable Peligro en su Uso Normal



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Tipo de aplicación	Insectos a controlar	Lugar de aplicación	Dosis recomendada
Aspersión	Voladores: moscas, zancudos, polillas, tábanos, avispas, etc.	Interior Exterior	50 ml / 5 L de agua / 100 m ² 75 ml / 5 L de agua / 100 m ²
	Rastreros: cucarachas, hormigas, pulgas, termitas, garrapatas, arañas, etc.	Interior Exterior	75 ml / 5 L de agua / 100 m ² 100 ml / 5 L de agua / 100 m ²
Termoniebla	Voladores, rastreadores y arácnidos	Espacial (no residual)	50 ml / 1 L solvente / 1.000 m ² 50 ml / 1 L solvente / ha
ULV	Voladores, rastreadores y arácnidos	Focalizada (residual) Espacial (no residual)	50 - 100 ml / 1 L agua / 100 m ² 50 ml / 1 L agua / 1.000 m ²

*Para aplicaciones especiales con ULV se recomienda el uso de glicol o Carrier.

Doctor Fly EC elimina moscas, garrapatas, termitas, zancudos, baratas, hormigas, pulgas, arañas, chinches, polillas, tábanos y otros insectos plaga. Puede ser empleado en tratamientos contra insectos molestos sobre cualquier tipo de superficies del hogar, industrias de alimentos y todo tipo de construcciones y sus alrededores.

Técnicas de aplicación

Aplique, mediante un atomizador, bomba manual doméstica o bomba de espalda manual; asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurre). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas e insectos rastreados deben asperjarse los lugares de tránsito o descanso de los insectos. Emplee un 50% más de la dosis indicada en superficies porosas o absorbentes de exteriores. Las dosis pueden variar de acuerdo con el equipo empleado, consulte el manual del fabricante.

Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje sobre animales domésticos. Para su seguridad debe usar pantalones largos, camisa y guantes para la preparación y aplicación del mismo. Es aconsejable el uso de protección respiratoria y antiparras. No asperje sobre alimentos ni utensilios de cocina. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no

debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite aplicarlo contra el viento. No coma, fume o beba cuando lo aplique. Luego de la aplicación y/o manipulación del insecticida debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Realice triple lavado de los envases de alimentos y para la vida marina,

Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Síntomas de intoxicación

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros Auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

DOCTOR FLY EC 1 L

En caso de intoxicación llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (En horario de oficina).

Condición de Venta: Especializada

Registro ISP N°: P-412/24

Composición:
Cada 100 g de producto contiene:
Cipermetrina 20 g
CÁS N° 52315-07-8
Otros componentes c.s.p. 100 g

Grupo químico: Piretroide.

Fabricado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358,
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



S:

V:

