

Raticida

RODEX

Soft Bait

ALTA TEMPERATURA

ALTA HUMEDAD

PALATABILIDAD


Fórmula

Brodifacoum N° CAS 56073-10-0.....0,005 g

Benzoato de denatonio (amargante).....0,001 g

Otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica IV: Poco probable peligro en su uso normal.

Presentación: Caja de 500 g / Balde de 10 Kg / Sachet de 10 g

Registro ISP N°: P-756/21

Fabricado por: Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika. Eslovenia.
Importado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358. Pudahuel. Santiago de Chile.

Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.
www.bts.cl.

* Foto de producto referencial.

Descripción del producto

FICHA TÉCNICA RODEX SOFT BAIT

Rodex Soft Bait es un rodenticida anticoagulante de última generación, altamente eficaz para el control de ratas y ratones. Con una sola dosis, logra resultados en 4 a 7 días.

Formulado con una mezcla atractiva de cereales, granos frescos y aceites esenciales, su deliciosa fragancia a vainilla lo convierte en un cebo irresistible para los roedores. Su pasta suave y altamente palatable asegura un consumo óptimo, superando la eficacia de los bloques parafinados tradicionales.

Este innovador formato mantiene su frescura y aroma en condiciones ambientales difíciles, como humedad, calor o heladas, sin perder efectividad. Además, viene listo para usar, lo que facilita su aplicación sin complicaciones.

Ideal para tratamientos preventivos, curativos o de choque, es perfecto para su uso en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias alimentarias, instalaciones pecuarias y más.

Su fórmula incluye un amargante eficiente que previene la ingestión accidental por niños o animales domésticos, garantizando un uso seguro en todo tipo de entornos.

Forma de aplicación

Rodex Soft Bait viene listo para usar, puede ser aplicado en cualquier época del año. Distribuya los cebos dentro de portacebos o en cajas cebadoras en los lugares más frecuentados por los roedores. Pueden ser aplicados en lugares de alta humedad. Se sugiere disponer los puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo.

Principales lugares de aplicación

- Junto a paredes y muros exteriores, detrás de muebles o lugares de tránsito de roedores, de manera de establecer cordones perimetrales que eviten el ingreso de ratas al lugar tratado.
- Bajo estanterías, pallets y góndolas exteriores. En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Bodegas, desagües, alcantarillas, botaderos y orillas de cursos de agua.

Ratas

- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de una alta población, se sugiere el cebar cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar cada 10 metros lineales.

Ratones o Lauchas

- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de una alta población, se sugiere el cebar cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar cada 5 metros lineales.

PLAGA A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de alcantarilla), <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado).	Interior y exterior.	1 a 2 sachet / 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha).		1 sachet / 3 a 5 metros lineales.

Peso Sachet: 10g.

Precauciones

- Este producto debe ser manipulado por adultos.
- No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación.
- Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de estos.
- Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura.
- Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.
- Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
- **Tiempo de reingreso:** Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Primeros Auxilios

- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Antídoto

Vitamina K.