

Pyriproxyfen 2%



KILARVOL® 2 EC



Insecticida regulador del crecimiento (IGR) en formulación de Concentrado emulsionable, eficaz en el control de etapas larvales de insectos voladores, rastreros y arácnidos.

- ✓ Control efectivo de larvas y estados juveniles de diferentes insectos.
- ✓ Realiza un control total mezclándolo con insecticidas adulticidas.

uso interior uso exterior



Contenido:
1 Litro

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



v.11



Clasificación toxicológica III
Ligeramente Peligroso



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Lugar a tratar	Plaga	Dosis de producto	Observaciones
Viviendas, casinos, restaurantes, bodegas, patios, agroindustrias, etc.	Pulgas	Tratamiento inicial: 125 a 200 ml / 5 L de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC, Cipermetrina 25 EC en las dosis habituales de estos productos. Tratamiento mantenimiento: 125 ml / 5 L de agua.	Aplicar mediante aspersión ligera con un cubrimiento de 100 m ² cada 5 litros de emulsión. Si la superficie es absorbente, puede aumentar la dosis hasta punto de goteo.
	Cucarachas, garrapatas, chinches, etc.	Tratamiento inicial: 250 ml / 5 L de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC, Cipermetrina 25 EC en las dosis habituales de estos productos. Tratamiento mantenimiento: 125 ml / 5 L de agua.	

KILARVOL 2 EC 1 L

Kilarvol 2 EC es un regulador del crecimiento (IGR) de los insectos y/o arácnidos que permite que insectos como pulgas (*Pulex sp.*, *Ctenocephalides sp.* y otras), baratas (*Blattella sp.*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*), chinches (*Cimex lectularius*) y otros insectos sean eliminados al no poder completar su ciclo de desarrollo.

Posee un efecto insecticida sobre formas pre adultas de insectos plaga, por lo que no posee efecto inmediato en el control de estados adultos.

Tiene un mecanismo de control diferente a los insecticidas tradicionales, por lo que se complementa apropiadamente dentro de un plan de manejo integrado de plagas.

Tiene un efecto incluso sobre cepas de insectos resistentes a los insecticidas de uso común (piretroides, organofosforados y carbamatos).

Kilarvol 2 EC debe ser mezclado con un insecticida adulticida para obtener un rápido control de insectos adultos, pudiendo emplearse como único método de control cuando el nivel de estos insectos-plaga sea baja. Posee una baja toxicidad para el hombre, animales domésticos y aves.

Para el control de pulgas, es recomendable realizar previamente un buen aseo de la vivienda o lugar a tratar. Se sugiere el uso de aspiradora en pisos y tapices.

Técnicas de aplicación:
Aplice mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda o manual. Asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada.

Para el control de insectos rastreros deben asperjarse los lugares de tránsito o descanso de los insectos.

Tiempo de reingreso: 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje sobre animales domésticos. Para su seguridad debe usar pantalones largos, camisa y guantes para la preparación. Es aconsejable el uso de protección respiratoria y antiplagas. No asperje sobre alimentos ni utensilios de cocina. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite aplicarlo contra el viento. No coma, fume o beba cuando lo aplique. Luego de la aplicación y/o manipulación debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Realice triple lavado de los envases antes de desechar. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. No elimine el contenido de este envase a cursos o fuentes de agua.

Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Síntomas de intoxicación: Vómitos, diarrea, respiración inusual, pérdida de control muscular.

Primeros auxilios
Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto,

enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (En horario de oficina).

Condición de Venta: Especializada

Registro ISP N°: P-483/22
Registro Panamá MDA: RQ-431-21

Composición:
Cada 100 g de producto contiene:
Pyriproxyfen 2 g
N° CAS: 95737-68-1
Otros componentes c.s.p. 100 g
Grupo químico: Mímico de hormona juvenil.



S:
V:

Fabricado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



v.11