

R A T I C I D A

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N° P-756/21

Composición:

Cada 100g contiene:
Brodifacoum0,005g
N° CAS 56073-10-0)
Benzoato de Denatonio.....0,001g
Excipientes c.s.p. 100g



VENENO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

Rodex


Clasificación Toxicológica IV,
Poco probable peligro en su uso normal

Rodex

**MÍNIMA DOSIS PARA UN
MÁXIMO CONTROL**



✓ *Máximo atractivo en todo tipo
de ambientes.*



CONTENIDO:
500g
Sachets de 10g aprox.



R A T I C I D A

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N° P-756/21

Composición:

Cada 100g contiene:
Brodifacoum0,005g
N° CAS 56073-10-0)
Benzoato de Denatonio.....0,001g
Excipientes c.s.p. 100g



VENENO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

Rodex

Clasificación Toxicológica IV,
Poco probable peligro en su uso normal

| Plaga a controlar | Lugar a tratar | Dosis |
|---|---------------------|--|
| <i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de Alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado) | Interior y Exterior | 1 a 2 sachet / 5 a 10 metros lineales. |
| <i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha) | | 1 sachet / 3 a 5 metros lineales. |

RODEX SOFT BAIT es un rodenticida anticoagulante de última generación, altamente eficaz para el control de ratas y ratones. Con una sola dosis, logra resultados en 4 a 7 días. Formulado con una mezcla atractiva de cereales, granos frescos y aceites esenciales, su deliciosa fragancia a vainilla lo convierte en un cebo irresistible para los roedores. Su pasta suave y altamente palatable asegura un consumo óptimo, superando la eficacia de los bloques parafinados tradicionales. Este innovador formato mantiene su frescura y aroma en condiciones ambientales difíciles, como humedad, calor o heladas, sin perder efectividad. Además, viene listo para usar, lo que facilita su aplicación sin complicaciones. Ideal para tratamientos preventivos, curativos o de choque, es perfecto para su uso en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias alimentarias, instalaciones pecuarias y más. Su fórmula incluye un amargante eficiente que previene la ingestión accidental por niños o animales domésticos, garantizando un uso seguro en todo tipo de entornos.

Técnicas de aplicación

Rodex Soft Bait viene listo para usar, puede ser aplicado en cualquier época del año. Distribuya los cebos dentro de portacebos o en cajas cebadoras en los lugares más frecuentados por los roedores. Pueden ser aplicados en lugares de alta humedad. Se sugiere disponer los puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo.

Tiempo de reingreso: No tiene. Inmediatamente después de la aplicación.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser manipulado por adultos. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación. Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de estos. Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura.

Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Síntomas de intoxicación

Observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Primeros auxilios

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.



Fabricado por:
Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Eslovenia.
Importado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios
S.A, Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago de Chile.
Contacto: recepcion@bts.cl Fono: (56) 2 2749 8540.
www.bts.cl