

R A T I C I D A

Ratamix Pasta es un raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores. Está formulado con ingredientes frescos y aromatizantes altamente atractivos para roedores. Posee, además, un efectivo insecticida (Fipronil) contra pulgas presentes en roedores, y, con ello, se logra realizar un efectivo control de roedores junto con la eliminación de las pulgas, que de otra manera persistirán en el ambiente buscando otro huésped como animales domésticos y personas.

El efecto de **Ratamix** sobre las pulgas que parasitan a los roedores, se verifica a contar de 24 horas de la ingesta de este producto por parte de los roedores. Las pulgas son hematófagas (se alimentan de sangre del roedor).

La dosis de insecticida presente en **Ratamix** es muy baja, por lo que no altera el consumo de cebos por parte de los roedores y no implica riesgo para las personas. Además, contiene un amargante que previene la ingesta accidental por parte del ser humano.

Para producir la muerte de los roedores y sus pulgas se necesita sólo una dosis, esto ocurrirá en un periodo de entre 4 - 7 días.

Ratamix Pasta está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención, en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc. Es resistente al agua y humedad, pudiéndose usar en interiores y exteriores húmedos conservando inalterable su acción y palatabilidad.

RataMix®
Una aplicación, dos soluciones

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

RataMix®

Una aplicación, dos soluciones




Elimina Roedores y sus Pulgas



Pasta

✓ Máximo atractivo en todo tipo de ambientes



CONTENIDO:
500g

Sachets de 10g aprox.



En caso de intoxicación llame al:

CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540
(En horario de oficina)

Condición de venta: GENERAL.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente peligroso.

FÓRMULA

Cada 100g de producto contiene:
Bromadiolona.....0.005 g
(N° CAS 28772-56-7)
Fipronil.....0.005 g
(N° CAS 120068-37-3)
Benzoato de denatonio.....0.001 g
Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo químico:

Bromadiolona: Derivado cumarínico.
Fipronil: Fenilpirazol.

Registro ISP N° P-895/20



VENENO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

RataMix®
Una aplicación, dos soluciones

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

R A T I C I D A

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 sachets / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 sachet / 3 a 5 metros lineales

Indicaciones de uso y dosis

Producto listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por ellos (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, botaderos, entradas de madrigueras, orillas de cursos de agua, etc.). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad.

Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC) o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Tiempo de Reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Primeros auxilios

Ingestión accidental: No inducir el vómito. Acudir al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto.

Contacto con la piel: Lave con agua y jabón.

Contacto con los ojos: Retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: El ingrediente anticoagulante se trata con vitamina K.

El ingrediente insecticida no posee antídoto y sólo se trata sintomáticamente.

Condición de venta: General



Fabricado por:
Unichem d.o.o.
Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika.
Eslovenia.

Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel.
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl