

R A T I C I D A



Rodex®



MÍNIMA DOSIS PARA UN MÁXIMO CONTROL

Rodex Minibloque es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión. Su uso está indicado para exteriores, donde existen condiciones de humedad y variaciones de temperatura.

Puede ser aplicado en tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención, exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc.

Modo de uso: Producto listo para usar. Distribuya los bloques en cajas o tubos cebadores en lugares de tránsito de los roedores, que no sean accesibles a niños y animales domésticos. Puede ser aplicado en lugares de alta humedad. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarín o Rata de alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado)	4 a 8 Minibloques / 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	2 a 4 Minibloques / 3 a 5 metros lineales.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación:

Este producto debe ser manipulado por adultos. No beber, fumar o comer durante su aplicación. Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación. Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de estos. Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura. Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.



Minibloque Parafinado

✓ Resistente al agua y humedad.

Primeros Auxilios

Ingestión: No inducir el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56)2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N°: P-330/22

Composición:

Cada 100g contiene:
Brodifacoum0,005g
(N° CAS 56073-10-0)
Benzoato de Denatonio.....0,001g
Excipientes c.s.p. 100g



CONTENIDO
5Kg

Minibloques de 5g aprox.



7 804667 140825



MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



Serie:
Vence:

Fabricado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel
Santiago de Chile.
Fono: (56)2 2749 8540
www.bts.cl



Clasificación Toxicológica IV,
Poco probable peligro en su uso normal



v.2