

RODEX®

RATICIDA ANTICOAGULANTE 2ª GENERACIÓN MATA TODO TIPO DE ROEDORES (RATAS Y RATONES / LAUCHAS)

Composición: Cada 100 g de producto contiene:

Brodifacoum*	0,005 g	N°CAS 56073-10-0
*3-[3-(4'-bromo[1,1'-difenil]-4-ii)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiren-2-ona		
Benzoato de denatonium (amargante)	0,001 g	
Excipientes c.s.p.	100,0 g	

Serie:

Vence:



Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7356, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7356, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Precauciones

Conserve Rodex en su envase original, en un lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños, de personas no responsables y de animales domésticos. Evite el contacto directo con la piel. Usar guantes para su aplicación y lavarse las manos con agua y jabón después de ésta. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos y lejos de alimentos, bebidas y de lugares de preparación de los mismos. Elimine los pellet/cebo no consumidos y destruya los envases vacíos. Entierre a los roedores muertos. No almacene junto a alimentos.

Primeros Auxilios

Los síntomas de intoxicación aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo. Su principal sintoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado, el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre. En caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por al menos 10 minutos. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Procurar atención médica de inmediato. Por la naturaleza de la formulación de este producto, es improbable la intoxicación por inhalación, sin embargo, de ocurrir se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.

Tratamiento médico: Concurra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta u hoja de seguridad de este producto.

Antídoto: Vitamina K1.

Grupo Químico: Brodifacoum, derivado cumarínico.

Toxicidad: Este producto es de baja toxicidad para el Hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingesta. Tóxico para peces. No elimine en cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA U HOJA DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES DEBER SER DESTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

Teléfono de emergencia:
CITUC (atención 24 hrs.) : (56) 2 2635 3800
BTS Intrade : (56) 2 2749 8540
Laboratorios S.A.

PELLETS
(Reg. ISP P-248/16)

CEBO RATICIDA
(Reg. ISP P-246/15)

5 Kg



CUIDADO



Contenido neto:

5 Kg

PELLETS
(Reg. ISP P-248/16)

CEBO RATICIDA
(Reg. ISP P-246/15)



CUIDADO



Rodex Pellet / Cebo

Descripción

Rodex es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata rápidamente ratas y ratones / lauchas. Necesita sólo de una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión.

Instrucciones de uso / Modo de uso

Puede ser aplicado en cualquier época del año

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	1 sachet cada 2 a 4 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	1 ó 2 sachet cada 6 a 12 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	1 ó 2 sachet cada 6 a 12 metros

Se debe aplicar en los lugares más frecuentados por los roedores: cañerías, desagües, entretechos, alcantarillas, botaderos. Repetir la dosis hasta notar que ha cesado el consumo.

No es fitotóxico y no tiene período de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ÉSTE.

Clase Toxicológica: IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal, Banda Verde.
Condición de Venta: Rodex Pellet: Especializada, Rodex Cebo: General.