

DOSIFICACIÓN

Plaga	Dosis
<i>Mus musculus</i> (Ratón o Laucha)	1 Sachet / 3 a 5 metros lineales.
<i>Rattus norvegicus</i> (Guisarén)	1 a 2 Sachets /
<i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	5 a 10 metros lineales.

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año.

Primero asee el lugar y determine áreas de tránsito posible de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas, botaderos y orillas de cursos de agua). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad.

Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente.

Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de **Rodex Soft Bait**. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC) o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos.

Evite el contacto con la piel. Use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de ésta.

No beber, fumar o consumir alimentos durante la aplicación. Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos, lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de los mismos.

No almacene junto con alimentos.

Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos.

Este producto es extremadamente tóxico para mamíferos y vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

TIEMPO DE REINGRESO

Inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Puede causar irritación ocular moderada.

S:

V:

E:

32870

CONTENIDO APROX.**10 Kg**

Sachets de 10g Aprox.

**R A T I C I D A****Rodex****SOFT BAIT**

LISTO PARA USAR

BLOQUE PARAFINADO
BLANDO
Brodifacoum 0,005%**Mínima Dosis
para un Máximo
Control**

Rodex Soft Bait es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, para el control de ratas y ratones (lauchas). Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión.

Rodex Soft Bait es un cebo blando elaborado con una atractiva mezcla de cereales, granos frescos y aceites esenciales, moldeados como pasta para aumentar la palatabilidad, lo que asegura el consumo por parte de los roedores sin importar su especie.

Rodex Soft Bait posee una formulación que resiste condiciones ambientales desfavorables, sin perder su atractivo ni eficacia. **Rodex Soft Bait** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención. Puede ser empleado en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, hoteles, restaurantes, mataderos, oficinas, empresas pecuarias, industria de alimentos y todo tipo de construcciones e incluso permite cebar directamente las madrigueras de los roedores.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y acudir al centro asistencial más cercano llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

ANTIDOTO

Vitamina K1 (fitomenadiona).

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

**Condición de venta:** General.**Fórmula:**

Cada 100 g de producto contiene:
Brodifacoum.....0,005 g
(Nº CAS 56073-10-0)
IUPAC: 3-[3-(4'-bromodifenil-4-ii)-
1,2,3,4-tetrahidro-1-natil]-4-
hidroxicumarina
Benzoato de denatonio
(amargante).....0,001 g
Otros componentes c.s.p.....100 g

Fabricado por Útichem d.o.o.
Sinja Gorica 2, 1360, Vrhniko
Eslovenia

Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel
Santiago, Chile
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Grupo Químico:

Derivado cumarínico.

Registro ISP Nº: P-756/21

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y
ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**VENENO**

Clasificación Toxicológica IV, poco probable peligro en su uso normal.