

PRECAUCIONES GENERALES:

STOPFLY es un IGR (regulador del crecimiento de insectos) derivado del grupo de las triazinas.
STOPFLY posee una muy baja toxicidad.

Medidas de Precaución:
Evitar inhalar durante la aplicación y la dilución del producto.
No comer, fumar o beber durante la aplicación de producto.
Usar siempre ropa y equipo de protección adecuado: overall, máscara de protección respiratoria, anteojos, botas y guantes de goma.
No aplicar en recintos en donde se acumulan alimentos.
Lavarse bien las manos después de manipular.

Precauciones de Almacenamiento y Conservación:

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado.
Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Tóxico para organismos acuáticos.
No aplicar directamente al agua.
Puede afectar a larvas de abejas, no así a las abejas adultas.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

Síntomas de Intoxicación: Causa irritación moderada en los ojos; nocivo en caso de ingestión, absorción por la piel o si es inhalado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al afectado en reposo.
Contacto con los ojos: Retirar lentes de contacto y lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente. No aplicar ningún medicamento, excepto el indicado por el médico.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo la piel que se encuentra bajo las uñas. Sacar la ropa contaminada y lavar la piel.
Inhalación: Sacar a la persona desde el área contaminada al aire fresco. Si es necesario, aplique respiración artificial.

Antídoto

No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Condición de Venta: Especializada.

Registro ISP N° P-360/23

Fórmula:

Cada 100 g contiene:
Cirimazina sulfato 50 g
(CAS N°: 66215-27-8)
Otros componentes c.s.p. 100 g

Grupo Químico: Triazina.

INSECTICIDA / LARVICIDA MOSCAS



Insecticida regulador del crecimiento de larvas de moscas. Actúa impidiendo que éstas puedan completar su ciclo y emerger de la pupa. Es altamente recomendable para la implementación de un programa integral del control de moscas

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.**

Contenido: 500 g



STOPFLY funciona incluso ante larvas de moscas resistentes a otros insecticidas tradicionales.

STOPFLY no tiene efectos sobre las moscas adultas, por lo que se debe emplear solo en el tratamiento de las moscas preadultas (larvas).

STOPFLY actúa sobre larvas de otros dípteros de importancia en Salud Pública como los zancudos.

STOPFLY a diferencia de los insecticidas tradicionales, tiene como ingrediente activo un compuesto que afecta sólo a los insectos, por lo que posee una baja toxicidad para el Hombre y animales domésticos.

STOPFLY está indicado para ser usado en salas de basura, basurales, guano de animales domésticos, mataderos y otros lugares en donde se acumula materia orgánica susceptible de ser fuente de generación de moscas.

INTRUCCIONES DE USO

Dosis general: 1 g de STOPFLY por m² de superficie de materia orgánica a tratar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

STOPFLY se emplea mediante aspersión directa sobre el guano o sustrato a tratar, procurando mojar adecuadamente toda la superficie de éste.

Disolver una medida (20 g) de STOPFLY en 5 L de agua. Aplicar en dosis de 250 cc de solución por m² de superficie; es decir, 5 L de solución se deben aplicar sobre 20 m². Es muy importante respetar la dosificación y cubrimiento.

La aplicación debe ser realizada con un tamaño de gota gruesa (300 a 400 micras) mediante una máquina pulverizadora de espalda o bien una regadera.

El tratamiento debe ser complementado con insecticidas adulticidas tradicionales para el control de moscas adultas.

El tratamiento con STOPFLY debe ser repetido según las condiciones cada 20 a 45 días.

Tiempo de Reingreso: inmediatamente después de la aplicación.

Fabricado por:

Dankong Industry &
Trade Group Co. Ltd.
83 Jiefang North road,
Jiaojiang 318000,
Zhejiang, China.

Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Envasado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile



**Clasificación Toxicológica: Clase IV,
Poco probable peligro en su uso normal.**

